Staroegipatski razlomci,

3. dio

Neven Elezović, Zagreb

U trećem, posljednjem dijelu pod ovim naslovom, promatrat ćemo neke neriješene probleme povezane s prikazom razlomka u egipatskom obliku.

Cilj je ove rasprave ukazati na to da praktički ne postoji dio matematike koji je u potpunosti poznat i u kojem nije moguće i dalje znanstveno istraživati. Egipatski razlomci nastali su u ljudskoj civilizaciji u samom začetku matematičkog računa, a još i dan danas nude mnoštvo otvorenih i neriješenih problema.

Neke od ovih problema mogu i trebaju rješavati srednjoškolci zainteresirani za matematiku i/ili programiranje. To su zadatci otvorenog tipa za koje način rješavanja, a ponekad niti ishod, nije poznat.

Problem najkraćeg prikaza

Zadani razlomak $\frac{p}{q}$ prikaži u obliku

$$\frac{p}{q} = \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \dots + \frac{1}{n_k},$$

pri čemu je k najmanji moguć.

Drugim riječima, treba pronaći prikaz s najmanjim brojem pribrojnika.

Na kraju drugog dijela ovog članka napisani su najkraći mogući prikazi za neke razlomke s malim brojcima i nazivnicima. Općeniti odgovor pa i

algoritam za rješavanje ovog problema nisu poznati. Također, razlomci imaju uglavnom više različitih minimalnih prikaza. Broj takvih prikaza može se mjeriti stotinama i tisućama. Nije poznato kako se taj broj može odrediti za svaki konkretni razlomak.

Ovaj problem je koristan kao ozbiljna vježba programiranja koju mogu uspješno riješiti srednjoškolci. Razlomak treba biti s dovoljno malim brojnikom i nazivnikom tako da čitav postupak (koji treba osmisliti svaki programer po svom nahođenju) bude rješiv u realnom vremenu i s resursima koji su dostupni praktički na svakom računalu.

Tablica 1 je zadatak i cilj. U njoj je zadan broj pribrojnika u minimalnom prikazu za razlomke sa

prof. dr. sc. Neven Elezović, Zavod za primijenjenu matematiku, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, neven.elezovic@fer.hr

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
3		2	2	-	3	2	-	2	2	-	3	2	-	2	2	-	3	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	
4			3	-	2	-	2	-	2	-	3	-	2	-	3	-	2	-	2	-	2	-	3	-	2	-	3	-	
5				2	3	2	2	-	3	2	3	2	-	2	3	2	2	-	2	3	3	2	-	2	2	2	2	-	
6					3	-	-	-	2	-	3	-	-	-	2	-	3	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	
7						3	3	2	3	2	2	-	3	3	3	2	3	2	-	3	3	2	3	2	2	-	3	2	
8							3	-	4	-	3	-	2	-	4	-	3	-	2	-	2	-	3	-	3	-	3	-	
9								3	4	-	3	2	-	2	2	-	4	2	-	3	3	-	3	2	-	2	3	-	
10									4	-	3	-	-	-	3	-	2	-	2	-	3	-	-	-	2	-	2	-	
11										3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	-	3	2	3	3	3	2	3	2	
12											4	-	-	-	3	-	3	-	-	-	2	-	4	-	-	-	4	-	
13												4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	-	3	3	3	2	
14													3	-	4	-	4	-	-	-	3	-	3	-	2	-	4	-	
15														4	4	-	4	-	-	3	4	-	-	2	-	2	2	-	
16															5	-	3	-	3	-	4	-	3	-	3	-	3	-	
17																3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	
18																	4	-	-	-	4	-	3	-	-	-	4	-	
19																		3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	
20																			4	-	4	-	-	-	4	-	4	-	
21																				4	5	-	3	4	-	-	4	-	
22																					5	-	4	-	4	-	3	-	
23																						3	4	4	3	3	4	3	
24																							4	-	-	-	4	-	
25																								4	4	3	4	-	
26																									4	-	4	-	
27																										4	5	-	
28																											5	-	
29																												4	-

Tablica 1.

zadanim brojnikom i nazivnikom. Ono što se traži jest konkretan prikaz (barem jedan!) koji će imati ovdje predviđenu duljinu.

U tablici su dane duljine minimalnih prikaza za sve neskratljive razlomke s brojnikom i nazivnikom ne većim od 30. U njoj vidimo da je razlomak s najmanjim nazivnikom koji zahtijeva tri pribrojnika $\frac{4}{5}$, prvi koji zahtijeva četiri pribrojnika je $\frac{8}{11}$, a prvi za koji treba pet pribrojnika je $\frac{16}{17}$.

Zadatak 1. Napiši program s kojim ćeš moći dobiti najkraći prikaz za bilo koji razlomak iz priložene tablice.

Zadatak 2. Pronađi razlomak s najmanjim nazivnikom koji zahtijeva točno 6 pribrojnika.

(Odgovor: To je razlomak $\frac{77}{79}$.)

Zadatak 3. Pronađi razlomak s najmanjim nazivnikom koji zahtijeva točno 7 pribrojnika.

(Odgovor: To je razlomak $\frac{732}{743}$.)

Na prvi pogled mogli bismo nastaviti s ispisivanjem sličnih zadataka u nedogled. Ali, ovaj posljednji već se nalazi na rubu današnjih znanstvenih istraživanja i sigurno premašuje mogućnosti mnogih iskusnih programera.

Na izvrsno uređenoj stranici [1], na kojoj se može naći i prethodno navedena tablica, mogu se pročitati dodatne informacije o ovom zadatku, između ostalog da razlomak $\frac{732}{743}$ posjeduje ni manje ni više već točno 2771 različitih minimalnih prikaza duljine 7. Poznat je i prvi razlomak koji zahtijeva 8 pribrojnika: $\frac{27\,538}{27\,539}$ i tu naše znanje prestaje.

Neriješeni problem 1. *Pronađi razlomak koji u svom egipatskom prikazu zahtijeva barem 9 pribrojnika.*

Razumno je pretpostaviti da će to biti ponovno razlomak oblika $\frac{p-1}{p}$ za neki prosti broj p , ali onda treba tražiti među prostim brojevima većim od 800 400 jer su svi manji već provjereni.

Sylvesterov niz

Fibonaccijev pohlepni algoritam objašnjen u prethodnom nastavku mnogi nazivaju Fibonacci-Sylvesterovim algoritmom jer je Sylvester u članku [2] ponovno aktualizirao proučavanje egipatskih razlomaka. U trenu kad ga je pisao, Sylvester nije bio svjestan rezultata iz Fibonaccijeve knjige. Sylvesterov je članak slobodno dostupan na internetu, pa je interesantno usporediti stil nekadašnjeg pisanja s današnjim.

Srž njegovog članka jest u proučavanju niza brojeva $a_1, a_2, \dots$ koji služe u prikazu broja 1 s pomoću beskonačnog niza jediničnih razlomaka:

$$1 = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} + \dots \quad (1)$$

Različitih prikaza ovakvog oblika ima beskonačno mnogo. Među svima njima ističe se Sylvesterov niz kod kojeg su brojevi $a_1, a_2, \dots$ najmanji mogući. Evo kako dolazimo do tog niza.

Vrijedi

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2},$$

ali ovo nije egipatski prikaz, jer se pribrojnici ponavljaju. Zato ćemo drugi pribrojnik zamijeniti s

najvećim manjim jediničnim razlomkom, pa dobivamo

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}.$$

Ovaj je prikaz točan i rastav je završen. Da se to ne bi dogodilo, posljednji razlomak ponovno zamjenjujemo s prvim sljedećim jediničnim razlomkom:

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \dots$$

Razlika koja nedostaje je jedinični razlomak $\frac{1}{42}$. Njega ćemo zamijeniti s prvim sljedećim i nastaviti taj postupak u nedogled:

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{43} + \frac{1}{1807} + \frac{1}{3\,263\,443} + \dots$$

Nazivnici u ovim razlomcima definiraju Sylvesterov niz (a_n) .

Zadatak 4. *Dokaži da za Sylvesterov niz vrijedi*

$$a_1 = 2, \quad a_n = a_{n-1}(a_{n-1} - 1) + 1. \quad (2)$$

Zadatak 5. *Dokaži i ovaj prikaz*

$$a_1 = 2, \quad a_n = 1 + a_1 a_2 \dots a_{n-1}. \quad (3)$$

Prvi zadatak nije pretežak, a drugi direktno slijedi iz prvog. Možda je korisno provjeriti da za ovako definiran niz uistinu vrijedi (1), a to je ekvivalentno rješenju prvog zadatka. Imajući u vidu način kako smo definirali Sylvesterov niz, potrebno je provjeriti da za zbroj S sljedećeg niza

$$S = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \dots + \frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{a_n - 1} \quad (4)$$

vrijedi $S = 1$. Primijetite da je u posljednjem razlomku umjesto nazivnika a_n stavljen umanjeni nazivnik $a_n - 1$. Naime, za niz definiran s (2) vrijedi

$$\frac{1}{a_n - 1} = \frac{1}{a_{n-1}(a_{n-1} - 1)} = \frac{1}{a_{n-1} - 1} - \frac{1}{a_{n-1}}$$

i sada za zbroj razlomaka s desne strane u (4) imamo:

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{a_n - 1} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{a_{n-1} - 1} - \frac{1}{a_{n-1}} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{a_{n-2}} + \frac{1}{a_{n-1} - 1}. \end{aligned}$$

Dobili smo zbroj istog oblika, ali s jednim pribrojnikom manje. Nastavljajući postupak, sažimanje će se nastaviti sve dok ne preostane samo jedan član:

$$S = \frac{1}{a_1 - 1} = \frac{1}{2 - 1} = 1.$$

Time je tvrdnja dokazana. Rješenje zadatka 4 prati isti postupak, ali u obrnutom smjeru.

Zadatak 6. Dokaži da su svaka dva člana Sylvestrova niza relativno prosta.

Tvrdnja slijedi iz prikaza 3.

Zgodno je napomenuti da odavde slijedi beskonačnost skupa prostih brojeva. Naime bilo koji prosti broj može dijeliti samo jedan među brojevima $a_1, a_2, \dots$ jer su članovi tog niza međusobno relativno prosti. Budući da postoji beskonačno mnogo članova u ovom nizu, onda mora biti i beskonačno mnogo prostih brojeva.

Pohlepni algoritam za rastav razlomka može se dovesti u vezu s ovim algoritmom rastava broja 1 u beskonačan niz. Stoga nije neobično da je brzina rasta brojeva a_n analogna brzini rasta nazivnika u pohlepnom prikazu. Ta je brzina dvostruko eksponencijalna, može se dokazati da vrijedi

$$a_n \approx A^{2^{n+1}}.$$

Tu je A konstanta koja iznosi približno 1.2640847.

Harmonijski red

Zbroj jediničnih razlomaka harmonijskog niza je beskonačan:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots = \infty.$$

Tvrdnja se najlakše dokazuje grupiranjem članova niza zdesna u skupine koje imaju po 2^k članova,

$k = 0, 1, 2, 3, \dots$:

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots \\ = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) \\ + \left(\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8}\right) + \dots \end{aligned}$$

Zbroj pribrojnika u svakoj zagradi veći je od $\frac{1}{2}$ pa odatle slijedi tvrdnja.

To znači da ćemo računajući zbrojeve jediničnih razlomaka premašiti bilo koji zadani prirodni broj. S tim je u vezi ovaj poznati zadatak.

Zadatak 7. Zbroj

$$S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

nije cijeli niti za jedan $n > 1$.

Dakle, parcijalne sume harmonijskog reda rastu neograničeno i pritom uporno preskaču prirodne brojeve!

Dokaz ovog zadatka nije jedostavan, a izvodi se najčešće analizom djeljivosti. Najlakše ga je načiniti ako se dokaže pomoćna tvrdnja:

Postoji prost broj p koji dijeli samo jedan od brojeva $2, 3, \dots, n$.

Naime, tada se zbroj S može, nakon svođenja na zajednički nazivnik, napisati u obliku (uvjeri se u to!)

$$S = \frac{1 + kp}{n!}.$$

Brojnik nije djeljiv s p , a nazivnik jest pa ovaj razlomak nije cijeli broj.

Dokaz pomoćne tvrdnje slijedi iz poznatog rezultata Čebiševa: između svakog broja i njegovog dvostrukog postoji najmanje jedan prosti broj. Zato ćemo, krenuvši od broja n prema manjim brojevima, naići na prosti broj p koji ne može dijeliti nijedan prethodni prirodni broj.

Ovaj problem s harmonijskim redom povezan je s egipatskim prikazima. Riječ je o tome da se može

istraživati kako odabrati *podskup* skupa prirodnih brojeva tako da zbroj jediničnih razlomaka bude jednak nekom prirodnom broju.

To je uvijek moguće napraviti, za svaki prirodni broj i to na beskonačno mnogo načina. Može se, primjerice, pronaći prikaz kod kojeg prvi, najveći razlomak ima u nazivniku po volji velik prirodni broj!

Detaljnija analiza ovog problema premašuje okvire ovog članka, pa upućujem zainteresirane na izvore. Mogu krenuti od [1].

Za dodatne informacije o egipatskim razlomcima upućujem na članke [3] i [4] iz hrvatskih časopisa.

Erdős-Strausova hipoteza

Silvesterov članak je inicirao postavljanje problema koji spadaju u područje Diofantske analize, rješivosti jednadžbi u skupu cijelih brojeva. Najpoznatiji od tih problema, još uvijek neriješen, je sljedeći.

Neriješeni problem 2. (Erdős-Straus)

Svaki razlomak oblika $\frac{4}{n}$, $n \geq 4$ može se napisati kao zbroj triju jediničnih razlomaka.

Ovdje je dopušteno da jedinični razlomci budu jednaki.

Znamo li rješenje za prosti broj n , onda znamo i za svaki njegov višekratnik. Primjerice, iz

$$\frac{4}{5} = \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10}$$

slijedi

$$\frac{4}{5k} = \frac{1}{2k} + \frac{1}{5k} + \frac{1}{10k}.$$

Zato je dovoljno razmotriti proste brojeve n . Do današnjeg dana, hipoteza je provjerena za sve proste brojeve do uključivo 51 000 000-tog prostog broja (koji iznosi 1 003 162 753) i pokazala se istinitom. Međutim, dokaz da je ona istinita za svaki prosti broj n nije poznat, niti je poznat neki protuprimjer. Dokazano je da je hipoteza istinita za sve proste

brojeve, osim možda za one koji pri dijeljenju s 840 daju ostatke 1, 11^2 , 13^2 , 17^2 , 19^2 , 23^2 .

Za mnoge konkretne oblike broja n rastav je poznat, ali nisu pokriveni svi slučajevi, niti je izgledno da se eksplicitna formula može pronaći. Sljedeće dvije pokrivaju tek oko četvrtine slučajeva:

$$\begin{aligned} \frac{4}{12n+7} &= \frac{1}{3(n+1)} + \frac{1}{3(n+1)(3n+2)} \\ &\quad + \frac{1}{(12n+7)(3n+2)} \\ \frac{4}{24n+13} &= \frac{1}{2(3n+2)} + \frac{1}{2(n+1)(24n+13)} \\ &\quad + \frac{1}{2(n+1)(24n+13)(3n+2)}. \end{aligned}$$

Dokazano je da se svaki razlomak oblika $\frac{3}{n}$ može napisati kao zbroj najviše triju jediničnih razlomaka. Što je s ostalim brojnicima?

Neriješeni problem 3. (Sierpinski, 1956.)

Svaki razlomak oblika $\frac{5}{n}$, $n \geq 3$ može se napisati kao zbroj triju jediničnih razlomaka.

Niti ova hipoteza nije dokazana. Provjerena je za sve n do 922 321.

Problemi ove vrste svrstavaju se u *aditivnu teoriju brojeva* i smatraju najtežim za rješavanje, usprkos jednostavnosti u zadavanju problema. Tipičan primjer je Goldbachova hipoteza: svaki se parni broj može prikazati kao zbroj dvaju prostih.

LITERATURA

- 1/ <http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fractions/egyptian.html>
- 2/ J. J. Sylvester (1880.): On a Point in the Theory of Vulgar Fractions, *American Journal of Mathematics* Vol. 3, br. 4, 332–335.
- 3/ D. Jankov (2011.): Egipatski razlomci, *Osječki matematički list*, Vol. 11, br. 1, 11–18.
- 4/ P. Lončar (2015.): Egipatski razlomci, *Matematičko-fizički list*, Vol. LXV, br. 1, 8–16.